

**HÜVELYPLASZTIKAI MŰTÉT****A SZÓBELI FELVILÁGOSÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ BETEG TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT****Beteg neve:** _____ **Orvos neve:** _____**Születési dátum:** _____**TAJ:** _____

A hüvelyplasztikai műtét javallatát részben a süllyedékes betegségek és a vizelettartási nehézség, részben a nemi élet kényelmetlenségét okozó hüvely elváltozások képezik.

A beavatkozás célja:

A műtét célja a megsüllyedt mellső (húgyhólyag és hólyagnyak alatti terület), vagy hátsó hüvelyfal (végbélközeli hüvelyfal), valamint a rosszul, vagy hegesen gyógyult régi gátrepedés helyreállítása. A vizeletvesztés hüvelyi műtéti megoldásának egyik típusa a mellső hüvelyplasztika.

A beavatkozás technikája

A műtét az altatóorvos által kiválasztott, Önnel egyeztetett érzéstelenítésben történik. Előkészítés (szeméremszőrzet leborotválása, beöntés, nyugtató adása) után műtőasztalon, az érzéstelenítés beálltát követően a szeméremtestet és a hüvelyt fertőtlenítő oldattal mossuk le, majd a húgyhólyagba katétert vezetünk fel.

A hüvely mellső falán, a külső húgycsőnyílás alatt 1 cm-rel kezdve, hosszanti metszést ejtünk. A süllyedésnek megfelelő méretű hüvelyfalat preparálunk fel, majd a húgycsővet a környező kötőszövetbe vezetett öltéssel megemelve, megtámasztjuk azt. A hólyagot felpreparáljuk, öltéssel megemeljük, majd megfelelő méretű hüvelyfalat metszünk ki. A sebet öltésekkel egyesítjük.

Hátsó hüvelyplasztika során a hátsó hüvelyfal és a gát felső szakaszán rombusz alakú metszést ejtünk, a hüvelyhámrészt eltávolítjuk. A sérvet a környező kötőszövetbe vezetett öltésekkel, illetve a kétoldali végbélemelő (levator) izom rostjainak egyesítésével elbuktatjuk. A hüvelyfal és a gát sebet öltésekkel egyesítjük. A hüvelybe géz csíkot helyezünk.

Műtét utáni történések:

A műtét után saját kórtermébe kerül vissza. Folyadékot fogyasztani és enni csak teljesen éber állapotban szabad. A korai időszakban átmeneti fájdalom, hőemelkedés, vérzés jelentkezhet. A húgyhólyag katétert 2-3 nap múlva távolítjuk el. Panaszmentesség esetén 3-5 nap múlva bocsátjuk otthonába.

A beavatkozás veszélyei, lehetséges gyakoribb műtéti szövődmények:

A szövődmények gyakoriságát emelhetik egyes betegségek, gyógyszereszedés, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, az előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát.

Műtét alatti szövődmények: a fertőtlenítéshez, vagy az érzéstelenítéshez használt anyagokkal szemben túlérzékenységi reakció jelentkezhet.

Nagyon ritkán sérülhet a húgycső, a húgyhólyag és a végbél. A sérülések ellátása (amennyiben felismerésre kerülnek) a műtét során megoldható.

A műtét utáni korai időszakban jelentkező szövődmények: a műtétet követően átmeneti fájdalom, vizelési és székletürítési nehézség jelentkezhet. Ritkán előfordul utóvérzés, vérömleny, vérszegénység, sebgennyedés, sebszétválás, húgyúti gyulladás is. Nagyobb vérvesztés esetén vérátömlesztés (transzfúzió) adása is szükségessé válhat. A műtét alatti fektetésből adódóan perifériás beidegzési zavar is jelentkezhet az alsó végtagokban.

Műtét utáni késői időszakban jelentkező szövődmények: nagyon ritkán sipolyképződés a húgyhólyag, a húgycső és a hüvely, illetve a végbél és a hüvely között. A vizeletvesztési panasz és a hüvelyfal süllyedése később kiújulhat.

Teendők a beavatkozás után

Kontroll vizsgálatra a műtét után 6 héttel, panasz esetén azonnal jelentkezzen. Addig kímélő életmód javasolt, az ülőfürdő és a nemi élet tilalmával.

Alternatív megoldások

Fiatalabb korban speciális izomtorna, idősebb korban hüvelybe helyezhető segédeszközök (gyűrű, kocka) használata, gyógyszeres kezelés, illetve egyéb hüvelyi (szalag) műtétek.

A beavatkozás elmaradásának esetleges veszélyei:

Hólyagsérv esetén a vizeletvesztési tünetek fokozódhatnak, a hólyagban pangó vizelet megfertőződhet, gennyvizelés alakulhat ki. Végbélsérv esetén székletürítési nehézség, deréktáji fájdalom jelentkezhet. Előfordulhat a hüvely (és a méh) teljes kifordulása is.

A fentiekkel kapcsolatos kérdéseim és az erre kapott válaszok:

A fentiekről számomra részletes és érthető tájékoztatást adott:

Dr. _____

KÉRELEM ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT

A HÜVELYPLASZTIKAI MŰTÉT című tájékoztatót elolvastam, az orvos szóbeli tájékoztatását megértettem, az általam feltett kérdésekre kielégítő választ kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem és kérem annak elvégzését.

Budapest, _____ év, _____ hó, _____ nap, _____ óra, _____ perc

felvilágosítást végző orvos aláírása

beteg/törvényes képviselő aláírása

Továbbá **beleegyezem,**

* hogy a beavatkozással (műtéttel) összefüggésben bármely diagnosztikus céllal eltávolított sejtemet, sejtalkotórészemet, szövetemet, szervemet a vizsgálat után a Semmelweis Egyetem megőrizze, és azok felhasználásával olyan tudományos igényű feldolgozást, orvostudományi kutatást végezzen, amely a kórisme és a gyógykezelés hatékonyságát segíti, továbbá összhangban áll a hatályos jogi szabályozással.

igen nem _____

* hogy a műtét során video és/vagy fénykép felvétel készüljön, azt a műtét után a Semmelweis Egyetem megőrizze, és a hatályos jogi szabályozással összhangban az egyetemi oktatás (orvos- és szakorvosképzés) keretében, valamint tudományos igényű feldolgozás során (közlemény, szakkönyv, tankönyv) képi dokumentáció céljából azokat felhasználja.

igen nem _____

ELUTASÍTÓ NYILATKOZAT*

A kezelőorvos részletes felvilágosítása ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom. Az ellátás visszautasítása miatt bekövetkező káros következményekért orvosaimat felelősség nem terheli, és kötelezhető vagyok az ennek következtében felmerült költségek megtérítésére.

(Ha a beteg olyan beavatkozást utasít el, aminek elmaradása a saját, vagy a magzata életét veszélyezteti, vagy aránytalanul súlyos terhet, ill. maradandó károsodást okozhat, az elutasító nyilatkozatot két tanúnak az aláírásával is hitelesíteni kell).

Budapest, _____ év, _____ hó, _____ nap, _____ óra, _____ perc

felvilágosítást végző orvos aláírása

beteg/törvényes képviselő aláírása

1. sz. tanú aláírása

2. sz. tanú aláírása

*** Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 17. § (2):**

„A beteg beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások - ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is - egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti.”

Ezen betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat egy példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!