

Endometrium karcolás (méhkarcolás, scratching) tájékoztató

Dr. Timmermann Gábor (www.timmermann.hu)

(utolsó javítás: 2024. január)

Mennyibe kerül?

Az endometrium (méhnyálkahártya) karcolási eljárás díja: 50.000 Ft

A kezelés hatékonysága:

Az endometrium karcolását általában „kiegészítő” kezelésként ajánlják. Pozitív hatása nem teljesen bizonyított. A kiegészítő kezelésekkkel kapcsolatos további információkért látogasson el a HFEA webhelyére:

<https://www.hfea.gov.uk/treatments/explore-all-treatments/treatment-add-ons/>


Mi az endometrium karcolása?

Az endometrium karcolása egy olyan eljárás, amelyet azért végeznek, hogy megpróbálják javítani a beágyazódás esélyét, embrió beültetéskor. Javallata: vékony nyálkahártya, többször sikertelen beültetés.

Mit jelent az endometrium karcolása?

A méhszáj feltárása mellett a méhnyakon keresztül az endometrium karcolását egy merev, biopsziás katéterrel végezzük, amelyet ismételten mozgatunk a méhben folyamatos szívás alatt. Ezzel kontrollált roncsolást végünk a nyálkahártya felszínén.

A legtöbb páciens arról számol be, hogy a karcolás leginkább enyhe kellemetlenséggel jár. Maga az eljárás ritkán tart 30 másodpercnél tovább. Altatást, érzéstelenítést nem igényel.



Hogyan működik?

Egyes tanulmányok szerint, a méh nyálkahártyájának traumatizálása elősegíti az immunválaszt, a regenerációs folyamat fokozza az új vérerek növekedését, valamint sejtaktív anyagok és immunsejtek beáramlását, amelyek fontos szerepet játszanak a beágyazódásban.

Mikor végezzük a beavatkozást? Hogyan készüljünk rá?

Általában a menstruációs ciklus 20. és 25. napja között történik, és jótékony hatása akár 3 hónapig is eltarthat. Kérjük, érkezzen 15 perccel azelőtt a megbeszélte időpont előtt és tele hólyaggal. Javasoljuk, hogy az eljárás előtt körülbelül egy órával vegyen be egy egyszerű fájdalomcsillapítót, például paracetamolt vagy algopyrint.

Milyen kockázata van a beavatkozásnak?

Általában nagyon biztonságos eljárásnak tartják. Az eljárás kényelmetlen, és az eljárás után kellemetlen érzést és nagyon enyhe hüvelyi vérzést tapasztalhat. Nagyon ritka az esély a fertőzés kialakulására. Ha a beavatkozást követő néhány napon belül magas láz alakul ki, súlyos görcsöket vagy szokatlan vérzést (nem csak pecsételő vérzést), vagy fertőzésre gyanús hüvelyváladékot tapasztal, jöjjön vissza kontrollra.