



Tájékoztató a nőgyógyászati Duna Medical Center Magánkórházban végzett nagyműtétekhez

Engedje meg, hogy tájékoztassuk a nőgyógyászati nagyműtétek esetén szükséges információkról és adjunk néhány praktikus tanácsot a várható történésekhez. A műtét várható költségeiről a kórház honlapján tud tájékozódni, vagy ¹ kérjen árajánlatot kezelőorvosától! Legkésőbb a műtéti koordinátor küld végleges árajánlatot.

Műtéthez szükséges kivizsgálás:

- 6 hónapon belüli mellkasröntgen, vagy tüdőszűrő eredmény
- EKG (2 hónapnál nem régebbi)
- friss labor (vérkép, általános vizelet, máj- és vesefunkció, véralvadás)
- szükség esetén negatív terhességi teszt
- friss vércsoport + ellenanyagszűrés. 2 hónapnál régebbi leletet nem fogadunk el az ellenanyagszűrés miatt.

Altatóorvosi (aneszteziológiai) konzílium, gyógyszerek

A műtéti felkészülésben, kivizsgálásban kórházunk műtéti koordinátora fog segíteni. A műtét tervezett időpontja előtt legkésőbb 3 munkanappal, minden elkészült leletével jelenjen meg az altatóorvosi konzíliumban, ehhez időben kérjen időpontot a kórházi Call Centeren keresztül. Itt dől el a műtéti érzéstelenítés, altatás és gyógyszerelés módja. Néha előfordul, hogy további vizsgálatokat is elrendelnek.

Az alábbi gyógyszerek szedésének módosítására lesz szükség, melyet a műtét előtt meg kell beszélni:

- szájon át szedett antidiabetikumokat (vércukor csökkentő gyógyszerek) a műtéti időszakban inzulinra kell váltani
- szájon át szedett antikoagulánsokat (véralvadást csökkentő, ún. „vérhígító” gyógyszerek, pl. Syncumar, Warfarin) a műtéti időszakban injekciós heparin készítményekre kell váltani
- fogamzásgátló tabletták vagy klimaxban hormonpótló készítmények szedését fel kell függeszteni
- rendszeresen szedett nem szteroid gyulladáscsökkentők (Pl. Algopyrin, Demalgonil, Panadol stb.) szedését mellőzni kell a műtét előtti egy hétben!
- minden rendszeresen szedett gyógyszer alkalmazását beszéljük át műtét előtt!

Kórházi felvétel:

A kórházi felvételre a megbeszélt műtéti napon, hacsak nem kap a koordinátortól más utasítást, akkor 7:30-kor jelentkeznek (laminária szükségessége esetén 7:00-kor) a kórház recepcióján (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 5., első emeleti hall). Műtét előtti este szükség esetén bélelőkészítést kap (hashajtás, esetleg beöntés). Bélelőkészítés után már nem lehet, csak kevés szénsavmentes vizet fogyaszthat, maximum éjfélig.

Amennyiben bélelőkészítés nem szükséges, a műtét előtti napon csak egy könnyű vacsorát, éjfél után már csak kevés szénsavmentes vizet fogyaszthat!

Kérjük, hogy a műtéti felvételnél a beutalóját, minden elkészült és korábbi leleteit egy dossziében hozza magával!

Amennyiben rendszeresen szed valamilyen gyógyszert, hozza magával és a műtét napján egy korty vízzel vegye be a szükséges orvosságokat.



A műtéthez szükséges altesti borotválást ajánlott otthon elvégezni, amennyiben nem tudja magának elvégezni, felvételkor jelezze az osztályos nővérnek és kérjen segítséget.

A kórházi benntartózkodás idejére az alábbiakra lesz szüksége:

- hálóing, köntös
- a bent tartózkodás idejére minden napra több váltás fehérnemű (praktikus az eldobható papírbugyi)
- tisztasági betétek
- tisztasági felszerelés, zsebkendő, WC-papír
- papucs, törölköző
- 1 üveg szénsavmentes ásványvíz, pohár, evőeszközök (tányér nem szükséges)
- olvasnivaló



Bár az osztályon zárt szekrényben elhelyezheti holmiját, mégis kérjük, hogy értékeit ne hozza magával!

Műtét után:

A kórház elhagyása a műtét jellegétől, kiterjesztettségétől, és a műtét utáni lábadozástól függ. Erről kérje kezelőorvosa tájékoztatását. A kórházi látogatási rendről kérjük tájékozódjon és erről hozzátartozóit értesítse.

Otthonában a műtétet követő napokban, egyes műtétek esetén akár 2 hétig is kímélő életmód, véralvadás csökkentő injekció (trombózis, tüdőembólia megelőzésére) és táppénz javasolt. Alapesetben 6 hétig tilos a házasélet, a sport és a kádfürdő (csak zuhanyozhat).

Panasz (különösen vérzés, láz, fájdalom) esetén azonnal jelentkezzen. Egyebekben a megbeszélte varratszedés és kontroll idején.

További esetleges kérdésével forduljon kezelőorvosához bizalommal!