

Ambuláns gátplasztika műtéti tájékoztató Dr. Timmermann Gábor rendelésén (utolsó módosítás: 2025. 01. 01.)

Mikor jön szóba a gátplasztika szükségessége:

- tág hüvelybemenet pl. hüvelyi szülés után, fejlődési rendellenességként
- torzító heg pl. gátmetszés, trauma
- vulvodynia (krónikus hüvelytornác fájdalom, krónikus berepedés)

Ha a hüvelymenet nem záródik megfelelően, akkor kellemetlen következmények lépnek fel, úgymint:

- kádfürdő, strandolás közben víz kerülhet a hüvelybe
- sportoláskor, együttlétkor levegő áramlik a hüvelybe, és az akár hangot is adhat
- krónikus hüvelygyulladás alakulhat ki
- hüvelyi együttlétnél csökkenhet a szexuális élvezet, orgazmus készség bármelyik félnél
- krónikus fájdalom pl. hegfájdalom, vulvodynia


Rendelésemen előzetes konzultáció és felmérés után vállalom ambuláns gátplasztikát, helyi érzéstelenítés mellett. Önállóan, vagy lézeres IntimaLase kezelés mellé. Lézeres kezelés hatékonyan feszesíti a hüvelyfalat, de a megtágult hüvely bemenet kezelése önállóan többnyire nem elégséges. Ilyenkor az egyik lézeres kezelési alkalom után a gátplasztika is elvégezhető.

Amennyiben a hüvelypasztika nem indokolt, csak a gátplasztika, olyankor járóbeteg ellátás keretén belül, helyi érzéstelenítésben is elvégezhető a beavatkozás.

Hüvelypasztikát csak kórházi műtőben vállalom, fekvőbeteg ellátás részeként.

A műtét menete:

A gát területét fertőtlenítjük, majd tonogenes Lidocainnal érzéstelenítjük. Ezután kimetsszük a gátból a megnyúlt részt, vagy a heget. Véréscsillapítás után a gátat felszívódó varratsorral egyesítjük.



Műtét utáni tanácsok, utókezelés:

A műtét után a seb kezelése megegyezik a gátmetszés sebének kezelésével. A műtét után 4 hétig nagyon óvatosan szabad csak mozogni, leülni, felállni, a sebet megtörölni. 6 hétig tilos a sport, kádfürdő, házasélet, tampon használata. Ha a seb váladékozna, vérezne, begyulladna, szétnyílna, azonnali kontroll javasolt. A sebet tisztán kell tartani. Toalett után a seb óvatosan törölhető intim törülőkendővel, vagy tiszta vízzel leöblíthető. Kötni nem szükséges, intim betét viselhető. Hüvelykrém óvatosan használható indokolt esetben. Felszívódó varratnál varratszedés nem szükséges.

Lehetséges szövődmények:

- fájdalom, fájdalmas közösülés
- váladékozás, utóvérzés, sebfertőzés
- kóros hegesedés, sebszétválás, varratelégeltelenség
- a hüvelybemenet túlzott beszűkülése

A műtét ára: 95.000 Ft