



## 3D virtuális méhtükrözés vizsgálat tájékoztató (utolsó módosítás: 2026. 06. 06.)

### A vizsgálat leírása:

Ön a méhüreg 3D ultrahangos negatív kontraszt anyagos vizsgálatára jelentkezett. Ennek során az üreg falait szétválasztó, a szervezet számára közömbös steril oldatot juttatunk egy steril katéteren keresztül a méhüregbe. A kontrasztanyag kirajzolja a méhüreg alakját, a méhüregben lévő kóros képleteket: pl. polyp, myoma, méhsövény, összenövés stb.. Felhívjuk figyelmét, a petevezetékek átjárhatóságáról ezzel a vizsgálattal nem tudunk információt szerezni. Ehhez az ún. HYCOSY vizsgálat szükséges. Ha HYCOSY vizsgálatot szeretne, kérem jelezze felénk!

### Hol tudjuk elvégezni?

A procedúrát ambuláns módon végezzük járóbeteg rendelésünkön (Budapesten és Balatonföldváron egyaránt), bejelentkezés alapján.

### Mikor végezzük?

A legoptimálisabb idő a menstruációt követő 10 napon belül (vérzés utolsó napja és középideje között!). Ekkor a nyálkahártya még nem túl vastag, és terhesség esélye is alacsony.

### A virtuális méhtükrözés vizsgálat ellenjavallatai:

1. Aktív kismencedei gyulladás
2. Menstruáció
3. Terhesség

### A virtuális méhtükrözés vizsgálat menete:

Hüvelyi ultrahangvizsgálatot végzünk üres húgyhólyag mellett a kismencedei viszonyok megállapításához 2D és 3 D-ben. Ezután a méhszájat egy egyszer használatos nőgyógyászati feltárával látótérbe hozzuk. Szükség esetén a méhszájat egy eszközzel rögzítjük (ritkán szükséges). A katétert feljuttatjuk a méhnyak kezdeti szakaszába. A katétert a végén lévő ballon felfújásával rögzítjük. A feltárási és a méhszájkifogó eszközöket eltávolítjuk. Ismét hüvelyi ultrahangot végzünk, miközben a katéteren keresztül bejuttatjuk a kontrasztanyagot.

A 2D és 3D képeket készítünk és értékeljük. Leletet készítünk megfelelő videó és fotódokumentációval.

A páciens pár percig fekvő állapotban pihen, miközben megfigyeljük. Ezután ultrahanggal ismételtelen leellenőrizzük a vizsgálati területet. A procedura fájdalommentes, mindössze kisebb kellemetlen érzéssel szokott járni. Altatásra vagy érzéstelenítésre nincs szükség. Amennyiben fájdalmat érez, azonnal jelezze, mert a vizsgálat bármikor megszakítható. Szorongó páciensek a vizsgálat előtt 30 perccel nyugtatót, fájdalomcsillapítót vehetnek be egy korty vízzel. Rendelünkben csak egyszerhasználatos eszközökkel dolgozunk!

### Virtuális méhtükrözés lehetséges szövődményei, és előfordulásuk a szakirodalom alapján:

1. allergia a kontrasztanyaggal szemben: nincs
2. méhfal sérülés (perforáció) 1:1000
3. gyulladás 1:100
4. hirtelen vérnyomás esés 1:200





### Megjegyzések, előkészületek:

- A vizsgálat előtti 3 este Betadine hüvelykúp használata javasolt (recept nélkül kapható).
- A vizsgálat előtt 2 órán belül ne étkezzon, de nyugodtan folyadékot bőségesen igyon.
- Igény szerint a vizsgálat előtt fájdalomcsillapítót és görcsoldót bevehet, a szorongásosak vagy pánikbetegek nyugtatót is.
- A vizsgálatra kísérővel érkezétek, lehetőleg aznap ne vezessen.
- A vizsgálatot a társadalombiztosító nem téríti. Rendelésünk egészségpénztárakkal szerződésben áll, így a vizsgálat díját visszaigényelheti, ha van egészségpénztári tagsága.
- A vizsgálat után 24 óráig sport, kádfürdő, szexuális élet kerülendő. Inkább kímélő életmód javasolt!

### A vizsgálat alapdíja 80.000,- Ft, mely az alábbiakat tartalmazza:

- a kismencedei szervek teljes vizsgálata a fentiek szerint, valamint a méh speciális katéteres feltöltése steril oldattal és erről 3 dimenziós felvételek, rétegfelvételek készítése
- írásos orvosi dokumentáció
- képi dokumentáció a vizsgált területekről e-mailben küldve
- a vizsgálatról készült videó dokumentáció, melyet szerverünkről tölthet le a vizsgálat másnapjától 3 hónapig

További esetleges kérdésével forduljon hozzánk bizalommal!



*3D virtuális méhtükrözés felvételek (készítette: Dr. Timmermann Gábor)*